HERBICIDA
GRUPO O

ASP 2,4 DB XTRA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:

2,4-DB: esteres butílicos del acido 2,4 diclorofenoxibutírico…….....93,1 g*
Solventes y emulsionantes c.s.p……..……..…….....100 ml

* acido 2,4 diclorofenoxibutírico..... 76,0 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscripto en SENASA Nº: 38.933

Número de Lote: ver envase
Fecha de vencimiento: ver envase

Inflamable de 3º categoría.

GARANTÍA: Somos responsables de las caracteristicas físico-químicas del producto. Como la aplicación está fuera de nuestro control y no podemos prever las condiciones de empleo, queda fuera de nuestra responsabilidad los daños eventuales que pueda producir cualquier otro uso distinto al indicado en este marbete.

Versión: Julio 2018

Contenido Neto:
20 Litros
Origen Argentina

Nutrien™ Ag Solutions

Registrado por:
Nutrien Ag Solutions Argentina S.A.
Dardo Rocha 3278
B1640FTX Martinez - Argentina
TE: (011) 4717-4555
www.nutrienagsolutions.com.ar

NOCIVO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO
ASP 2,4DB XTRA es un herbicida selectivo sistémico indicado para el control de malezas de hoja ancha mencionadas en este marbete, en cultivos de alfalfa, maní y pasturas mixtas o consociadas. Puede ser usado en soja en mezcla con otro herbicida.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACION: Llenar con agua limpia el tanque del equipo de pulverizar hasta la mitad. Luego mezclar la dosis de **ASP 2,4DB XTRA** a utilizar en una pequeña cantidad de agua necesaria para completar el llenado del mismo.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Para tratamientos terrestres: los equipos deberán ser provistos de barras pulverizadoras con picos de bajo volumen recomendados para el uso de herbicidas y que aseguran una distribución uniforme del producto sobre la superficie a tratar.
El volumen a aplicar no debe ser inferior a 80 litros por hectárea verificando el correcto funcionamiento de la bomba y el mantenimiento de la presión constante.
Para tratamientos aéreos: en aplicaciones aéreas no se deberá extremar la reducción del volumen total a aplicar el que deberá ser de 30 litros por hectárea. Se recomienda no pulverizar con viento fuerte y habrá que suspender el tratamiento cuando la velocidad del mismo supere los 10km/h. Se recomienda lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm².
Las aplicaciones deben hacerse preferentemente en días de sol, con temperaturas superiores a 15°C y no más de 30°C. Se requiere muy buena humedad de suelo y del ambiente. Conviene tener en cuenta que la acción de este herbicida es lenta, por lo cual la apreciación de los resultados demanda un lapso mayor que al emplear otros productos.
En zonas marginales emplear dosis y volúmenes máximos. Bajo condiciones de sequía no se recomienda su aplicación, debiéndose esperar lluvias suficientes que aseguren una humedad adecuada para la reactivación del crecimiento de la maleza.
Previo a la aplicación, observar el estado de las malezas, las que deberán encontrarse en activo crecimiento, tiernas y pequeñas. Los cardos en general deberán estar en estado de roseta. Cuando las máquinas pulverizadoras utilizadas con **ASP 2,4DB XTRA** quieran emplearse para otros usos, deben lavarse cuidadosamente. Se recomienda dejarlas llenas de agua durante 48 horas para conseguir un buen enjuague.
RECOMENDACIONES DE USO:
Alfalfa: 1 a 1 ½ l/ha. Se puede pulverizar cualquiera sea el estado del cultivo, excepto en floración.
Para control de cardos pulverizar cuando las plantas de alfalfa son pequeñas, tercera hoja latifoliada o cuando rebrota de un pastoreo o corte.
Maní: 1 l/ha.
Pasturas: 1 l/ha. Se aplicará en pasturas integradas por gramíneas únicamente o consociadas con ciertas leguminosas como alfalfa, trébol blanco, trébol ladino, trébol hibrido, lotus corniculado.
Aplicar en estado de macollaje de las gramíneas y hasta antes del encañado y/o cuando las leguminosas sean pequeñas, 2-3 hojas trifoliadas, excepto en floración.
Soja: En mezcla con herbicidas de post-emergencia para control de malezas de hoja ancha. Las mezclas deben realizarse de acuerdo a las instrucciones de los productos con los cuales se va a aplicar **ASP 2,4DB XTRA**. No usar más de 50 cm³/ha de **ASP 2,4DB XTRA** en el cultivo de soja.
RESTRICCIONES DE USO:
Tiempos de carencia: Alfalfa (forraje), Maní (grano), Pasturas mixtas o consociadas (frescas), Soja (grano): 20 días.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."
TIEMPO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 48 hs.
COMPATIBILIDAD:
ASP 2,4DB XTRA es compatible con otros herbicidas tales como Bromoxinil en cultivo de maní, para control de Senecio burchelli en pasturas.
FITOTOXICIDAD:
No produce en las dosis y en los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones de uso. Debe tenerse especial cuidado que la pulverización no caiga, ni sea llevada por el viento sobre cultivos y plantas sensibles tales como algodón, tabaco, vid, girasol, árboles frutales, flores, hortalizas, árboles y arbustos ornamentales.
POSIBLES EFECTOS EN CULTIVOS SUBSIGUIENTES: no posee, se degrada a las 4-6 semanas de aplicado.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

RECOMENDACIONES DE USO:

Malezas-susceptibles a dosis de 1 a 1,25 l/ha:

Cardo asnal	*Silybum marianum*
Cardo	*Cardus acanthoides*
Cardo negro	*Cirsium vulgare*
Cardo pendiente	*Carduus nutans*
Cardo ruso	*Salsola Kali*
Cepa caballo	*Xanthium spinosum*
Diente de León	*Taraxacum officinalis*
Girasol	*Helianthus annus*
Girasolillo o Santa María	*Verbesina encelioides*
Morenita	*Kochia scoparia (muy joven)*
Mostacilla	*Rapistrum rugosum*
Nabo	*Brassica campestris, B, napus*
Nabón	*Raphanus sativus*
Perejilillo o Flor de Pajarito	*Fumaria officinalis*
Ortiga	*Urtica spp.*
Quinoas	*Chenopodium album, Ch. hircinum*
Saguinaria	*Polygonum aviculare*
Yuyo Colorado	*Amaranthus spp.*

Malezas-susceptibles a dosis de 1,25 a 1,50 l/ha

Abrojo grande	*Xanthium cavanillesii*
Cardo Pampa	*Onopordon acanthium*
Cerraja	*Sonchus oleraceus*
Enredadera	*Polygonum convolvulus*
Lengua de vaca	*Rumex crispus*
Yerba de pollo	*Alternanthera repens*

NOCIVO

PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Durante la mezcla y aplicación utilice indumentaria adecuada y evite el contacto con los ojos, piel y boca, como así también inhalar sus vapores. Utilice elementos de protección adecuados y no se exponga al pulverizado, luego de la aplicación higienícese adecuadamente, cámbiese la ropa usada y lávela inmediatamente.
RIESGOS AMBIENTALES:
Toxicidad de abejas: virtualmente no tóxico.
Toxicidad de aves: ligeramente toxico.
Toxicidad de organismos acuáticos: muy tóxico. Dejar una franja de seguridad entre el sitio de aplicación y cualquier curso de agua próximo.
Evitar la contaminación de fuentes y cursos de agua
TRATAMIENTOS DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Usar cantidades de producto ajustadas, de manera de evitar grandes excedentes. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases, no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc) y pueden aplicarse diluidos con agua sobre alambrados y zonas no cultivadas alejados de centros poblados y de transito frecuente de personas y animales domésticos.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Agregar hasta ¼ de agua en el envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Luego de realizar el triple lavado, inutilizar el envase para evitar su uso con otro destino y proceder a su envío a sitios autorizados por la normativa local para su disposición final.
ALMACENAMIENTO: Los plaguicidas formulados no son indefinidamente estables. Se aconseja el almacenamiento de los envases originales cerrados, en lugar seco, fresco, al abrigo de la luz directa o de fuentes de calor, humedad, etc.; en locales que mantengan la temperatura entre 0 y 30°C.
DERRAMES: Aísle y absorba el producto con arena o tierra, luego recogerlo y colocarlo en contenedores cuidadosamente identificados para ser transportados a sitios autorizados para proceder a su disposición final.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión accidental, recurrir inmediatamente a un médico.
En caso de inhalación llevar al accidentado a un lugar ventilado.
En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar con agua y jabón las partes expuestas al producto.
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Procurar asistencia médica.
ADVERTENCIA AL MEDICO: Clase II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. Categoria Inhalatoria II: (NOCIVO).
Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoria IV.
Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoria III. Causa irritación moderada a los ojos.
No sensibilizante dermal. Solvente: destilado alifático del petróleo.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: La ingestión y/o excesiva inhalación puede causar irritación del trato respiratorio, dolor de cabeza, mareos, nauseas, convulsiones, dependiendo de la concentración y t iempo de exposición. El contacto con ojos y piel puede causar irritación.
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: no presenta.
COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: no presenta reacciones de potenciación, aditividad o sinergismo.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
- Unidad Toxicológica del Hospital Gral. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. | Tel.: 4962-6666/2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones - Policlínico Posadas-Haedo-Pcia. Bs. As. | Tel.: 4654-6648 y 4658-7777
- Unidad Toxicológica del Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de Elizalde. | Tel.: 4300-2115 y 4307-5843/44 int. 72

ATENCION LAS 24 HS. EN CASO DE INTOXICACIONES
0800-888-TOXI (8694)
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA AGROQUÍMICA
CASAFE CAMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES
www.casafe.org